

fini les prothèses dentaire instables

Des millions de personnes à travers le monde sont complètement édentées. Plusieurs d'entre elles sont aux prises avec des prothèses qui ne tiennent pas, surtout à la mâchoire inférieure. Si tel est votre situation, vous savez combien il est embarrassant de voir sa prothèse instable, d'être incapable de manger certains aliments et de constater l'inefficacité des adhésifs pour prothèses.

Demandez à votre dentiste comment préserver votre sourire naturel avec une prothèse dentaire soutenu par les implants de BioHorizons.

sécurisez vos prothèses avec des implants dentaires



retrouvez votre confiance

Bien des gens qui ont des prothèses conventionnelles ne les portent pas, car elles ne tiennent tout simplement pas en place. Les implants dentaires vous permettent de garder vos prothèses en place et d'oeuvrer au quotidien en toute confiance.

Des centaines de milliers de personnes le confirment: les implants dentaires permettent de stabiliser les prothèses. Ce genre de traitements rencontre un succès grandissant grâce à son efficacité. En fait, de tous les dispositifs chirurgicaux implantables, les implants dentaires jouissent du taux de succès le plus élevé.

les avantages de la stabilisation des prothèses

- retrouver une capacité de mastication améliorant, ainsi votre régime et votre santé
- prononciation améliorée et confiance retrouvée
- confort accru en diminuant l'irritation causée aux gencives
- plus besoin d'acheter ou d'appliquer des adhésifs pour prothèses
- dans plusieurs des cas, votre dentier existant peut être réutilisé
- chirurgie mineure

BIOHORIZONS®

patientconnect™

comment ça se passe

Au cours de la chirurgie, des implants en titanium sont insérés dans la mâchoire.

La chirurgie prend environ une heure et peut être faite sous anesthésie locale. Votre prothèse existante est alors modifiée et repose confortablement sur les implants pendant la phase de guérison.


L'inconfort relié à la chirurgie est habituellement minime. Votre dentiste peut vous prescrire un médicament antidouleur et vous suggérer de modifier votre régime au cours de la phase initiale de guérison.

Une fois les implants guéris, votre prothèse est modifiée pour s'adhérer aux boules des implants. Votre prothèse tiendra jusqu'à ce que vous l'enleviez pour la nettoyer. Vous n'avez qu'à appliquer une pression vers le haut au-devant de la prothèse avec vos pouces pour la déloger.

soins postopératoires

Vous devez, chaque soir, retirer votre prothèse et brosser autour des implants pour retirer les aliments et la plaque. De plus, le brossage stimule la circulation sanguine des gencives adjacentes. Il est aussi très important de suivre les directives postopératoires fournies par votre dentiste et de maintenir votre hygiène dentaire pour assurer le succès à long terme de votre traitement.

vue intérieur d'une prothèse



êtes-vous un bon candidat

Chaque patient est différent et les résultats peuvent varier. Seul un clinicien formé peut déterminer le plan de traitement qui vous convient le mieux. Demandez à votre dentiste de vous expliquer les avantages et les risques reliés à la stabilisation des prothèses par implants. Il vous dira si cette solution vous convient.

avant traitement




patient insatisfait de l'instabilité du dentier

pendant la guérison



deux à quatre implants sont placés avec des piliers qui s'attachent au dentier

après traitement



le dentier modifié est mis en place tout en fournissant la stabilité et la confiance